

Drænanlæggelse i trommehinden (Tubulation)

Ved gentagende mellemørebetændelser eller ved vedvarende væske i mellemøret med efterfølgende smerter og nedsat hørelse kan det blive nødvendigt at anlægge dræn i trommehinderne. Drænet bevirker bedre ventilation af mellemøret og dermed langsom normalisering af slimhinden i mellemøret. Trommehinden vil efterhånden igen kunne svinge frit og hørelsen blive normal.

Under operationen:

Indgrebet foregår i fuld narkose gives på maske. Indsovningen varer under 1 minut.

Drænet, der er et par millimeter langt, placeres i en lille slids i trommehinden, efter at mellemøret er suget tomt for slim og evt. puds.

Efter operationen:

Senere på dagen vil barnet være upåvirket af operationen. Barnet skal være under opsyn det første døgn. Det vil sige at de ikke må sove uden opsyn.

Klager barnet over smerter efter operationen, må der gives Panodil efter vægt.

De første par dage efter operationen kan det flyde fra øret med væske, pus eller blod. Det må det gerne i ca. 3 dage, hvis det fortsætter, skal i ringe hertil og få en recept på øredråber.

Kontrol:

1 uge efter operationen skal patienten møde her til kontrol. Herefter vil vi jævnligt kontrollere ørene, indtil drænet er faldet ud af sig selv. Forældrene er selvfølgelig velkomne til at kontakte klinikken ved tvivlsspørgsmål.

Vær opmærksom på, at man gerne må bade/svømme med dræn, men at der så skal benyttes vandafvisende ørepropper. Disse kan købes på apoteket.