

FJERNELSE AF POLYPPER (ADENOIDEKTOMI)

Adenoidektomi betyder fjernelse af de adenoide vegetationer eller ”polypper”, der sidder i næsesvælget oppe bag den bløde gane. Polypperne fjernes ved udskrabning gennem munden.

Indgrebet foregår under fuld bedøvelse.

Efter operationen

Barnet vil blive observeret på klinikken, indtil hans/hendes tilstand er stabil.

Efter narkose skal barnet være under opsyn det første døgn og må ikke sove uden opsyn

Efter operationen kan drøblen føles mere fyldig end normalt (vandig hævelse), og tungen kan føles tykkere efter trykket fra mundspærren.

Når i kommer hjem må barnet drikke og spise koldt og flydende, altså f.eks. is, yoghurt og lign. Dagen efter må barnet spise normalt.

I timerne efter operationen vil der kunne komme lidt blodtilblandet slim ud af såvel næse som mund. Det er helt naturligt. I meget sjældne tilfælde kan der tilkomme mere pågående blødning og I skal da ikke tøve med at kontakte klinikken inden kl 15 eller søge nærmeste skadestue/vagtlæge efter kl 15.

Barnet skal passes hjemme i 2 døgn. Der vil sjældent efter det første døgn være behov for smertestillende. Ved smerter kan dog gives Paracetamol/Pinex/Panodil efter vægt.

Vigtigt: I tilfælde af blødning, skal du hurtigst muligt tage kontakt til læge.

Husk kontrol efter 2 måneder

V.1.3/RJ/19.04.2023

Næste rev.: 19.04.2025