

Ruta Jacobsen

Speciallæge i øre- næse- halssygdomme

Danmarksgade 25

9900 Frederikshavn

Tlf nr. 98432300

Navn:

Mandag d. kl. er der afsat tid til operation af deres barn i fuld bedøvelse.

I bedes møde 15 min før, og barnet skal ledsages af 2 voksne personer.

Barnet skal være fastende, når i ankommer, hvilket vil sige at det ikke må have fået noget at spise inden for de sidste **6 timer**. – heller ikke bolsjer, tyggegummi eller lignende. Barnet må gerne få lidt vand eller saftvand indtil 2 timer før operationen.

Efter operationen skal barnet køres hjem, og under denne hjemtransport skal der være en ledsager ud over chaufføren med til opsyn. Det tilrådes at medbringe en plastpose eller lignende, da opkastning kan forekomme. Resten af dagen hjemme, tages stille og roligt, i barnet tempo.

Vanlig medicin, evt. astmamedicin og epilepsimedicin tages som normalt, om morgen i spray eller tablet form i lidt vand. Dog mindst 1 time før operation.

Hvis dit barn skal have fjernet polypper eller opereres i mund/mundhule:

Smertebehandling 1 time før operationstidspunkt. Giv Panodil, Pinex, Pamol (som stikpille, mixtur eller tablet, med **lidt** vand.) Giv dosering efter barnet vægt og produkt anbefaling, som står på pakken.

Det første døgn efter operationen skal barnet holdes i ro og må kun få kold, kølende kost. (For eksempel: mælkeprodukter som yoghurt, koldskål, is og drikkevarer.)

Barnet holdes hjemme to dage efter operationen.

Fasteskema

Hermed lidt informationer vedrørende bedøvelse af dit barn i øre- næse- hals praksis.

Faste: Det er vigtigt at dit barn er fastende inden operationen.

- Dit barn må ikke spise mad, få mælkeprodukter/ modermælkserstatning, slik med mere, 6 timer inden bedøvelsen.
- Ammer du dit barn, må det ammes indtil 4 timer før bedøvelsen.
- Indtil 2 timer før bedøvelsen må dit barn få lidt klar væske. (vand/saft eller juice uden frugtkød)
- Max 30 ml vand senest en time for operation, hvis der skal tages smertestillende efter anbefaling.
- Ellers ingen indtagning af noget de sidste 2 timer.

Medicin: Hvis dit barn har astma/astmatisk bronkitis og får inhalationsmedicin, er det vigtigt, at barnet får vanlig inhalationsmedicin på operationsdagen. Hvis dit barn får reflux, er det ligeledes vigtigt, at barnet får sin medicin på operationsdagen. Evt. epilepsimedicin skal også tages om morgen.

Hvis dit barn skal have smertestillende forud for operationen, vil du blive orienteret af øre- næse- halslægen.

Ankomst: Ved ankomst på operationsstuen, vil vi spørge til CPR nr. og hvilken operation, der er planlagt. Dette er en del af vores sikkerhedsprocedure forud for operationen. Vi vil også spørge til om dit barn har været bedøvet før, om dit barn lider af kroniske sygdomme og får medicin, om dit barn lider af allergi, om dit barn har rokketænder. Dette er ligeledes en del af vores sikkerhedsprocedure forud for operationen.

Selve operationen: Dit barn bliver bedøvet ved at få en maske på og inhalerer sovemedicin (Sevorane). Dit barn skal sidde ved dig, så du kan holde barnet i hånden. Alternativt kan barnet ligge på lejet. Sovemedicinen lugter ikke godt og nogle børn bliver kede af det. Dit barn falder i søvn indenfor 1 minut. Under indledningen af bedøvelsen er det helt normalt at der kan forekomme ufrivillige øjenbevægelser/ eller ufrivillige bevægelser af arme og ben. Når dit barn sover, bliver du vist ud i venteværelset, hvor du sidder til operationen er færdig. Vi henter dig når operationen er overstået.

Overvågning: Når operationen er overstået, bliver du hentet med det samme, så du kan være der, når dit barn vågner. Vi observerer dit barn indtil barnet er vågent og klar til udskrivelse.